



NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

naziv **DAJANJE OČESNIH MAZIL**

koda **19.02**

Ključne besede: **očesna mazila, medicinska sestra, toaleta očesa**

Namen aktivnosti: **Preventivni, terapevtski**

Potrebni pripomočki:

- sterilna fiziološka raztopina s kapalko
- nesterilne rokavice brez pudra
- sterilni tamponi
- sterilne vatrirane palčke
- predpisana očesna mazila
- sterilni očesni tamponi
- samolepilni pritrditveni trak

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti):

10-20 minut (odrasli)
10-30 minut (otroci)

Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene in babiške nege:

Sekcija MS in ZT v oftalmologiji

Potrebeno število oseb za izvedbo aktivnosti:

1-2

odgovorna oseba protokola:

Bernarda Mrzelj

omejitve, pripombe

Aktivnost ZBN lahko izvede:

bolničar	NE
tehnik zdravstvene nege	DA
diplomirana medicinska sestra	DA
diplomirana babica	DA



NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:

1.	Preverimo naročilo zdravnika.	opombe: <i>Pravilo 10p: predpisano zdravilo, prava količina, ob pravem času, na predpisani način, pravemu pacientu, v pravo oko, v pravih okoliščinah, s pravimi navodili pacientu in njegovo pravico da zdravilo zavrne, prava ocena učinka zdravila, pravilno dokumentirati</i>
2.	Pacienta vprašamo o prisotnosti alergičnih reakcij na zdravila.	<i>Zagotavljamo varen postopek.</i>
3.	Razkužimo roke.	<i>Preprečimo okužbo</i>
4.	Postopek pacientu razložimo.	<i>Pacienta informiramo.</i>
5.	Pacienta namestimo v primeren položaj (leže ali sede).	<i>Če sedi, naj glavo nagne nazaj.</i>
6.	Razkužimo roke in oblečemo zaščitne rokavice.	<i>Preprečimo prenos okužbe</i>
7.	Opravimo toaleto očesa, če je to potrebno.	<i>Toaleto očesa opravimo, če so trepalnice zlepiljene zaradi izcedka ali mazila. Če je potrebno narediti toaleto na obeh očeh, to opravimo ločeno, vsako oko posebej s sterilnimi pripomočki. Fiziološko raztopino nakapamo v oko (namočimo kožo vek in oko). S sterilnimi tamponi brišemo od notranjega očesnega kota proti zunanjemu kotu (izognemo se prenosu morebitnega infekta skozi punktum - solzna luknjica - vhod v solzni kanalček. Paziti moramo, da ne poškodujemo roženice. Čistimo z enkratnimi potezami, potem tampon zavrzemo. Običajno za toaleto enega očesa zadostuje 4-6 tamponov. Snamemo in odvržemo rokavice in razkužimo roke.</i>
8.	S tamponom rahlo povlečemo spodnjo veko navzdol proti ličnici. Pacient pogleda navzgor.	<i>Omogočimo aplikacijo mazila. Pri otrocih in dojenčkih ločimo veki tako, da s palcem povlečemo spodnjo veko in kazalcem zgornjo veko – ne pritiskamo na oko, ampak na kosti.</i>
9.	Mazilo držimo na konici tube v bližini očesa in stisnemo majhno količino mazila v veznično vrečko, od notranjega očesnega kota proti zunanjemu očesnemu kotu.	<i>Preprečimo okužbo aplikatorja. Ne dotikamo se vek, trepalnic ali površine očesa. Če kontaminiramo mazilo, ga zavrzemo. Praviloma za vsakega pacienta uporabljamo svoje mazilo. Količina mazila, ki zadostuje je do 1cm.</i>
10.	Ko apliciramo mazilo, držimo spodnjo veko navzdol, da se mazilo topi. Pacienta prosimo, da nežno zapre oko.	<i>Tako zagotovimo enakomerno porazdelitev mazila po površini očesa.</i>
11.	S tamponom obrišemo preostanek mazila od notranjega proti zunanjemu očesnemu kotu.	<i>Ne pritiskamo na veke in ne drgnemo očesa.</i>



NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

12.	Če ima pacient predpisane očesne kapljice in mazila istočasno, kapljice vedno apliciramo vsaj 5 minut pred mazilom.	Omogočimo absorbcojo.
13.	Pacienta opozorimo, da bo nekaj časa (do 10 minut) videl megleno.	Po površini roženice se naredi masten film.
14.	Opazujemo neželene lokalne in sistemske učinke mazil.	Izvajalec postopka in pacient mora poznati stranske učinke zdravila.
15.	Če je predpisano, oko pokrijemo z očesnim tamponom.	Pacient zapre obe očesi, namestimo očesni tampon in ga prilepimo.
16.	Datiramo novo odprta mazila.	Glede uporabnosti in shranjevanja odprtih mazil upoštevamo navodila proizvajalca.
17.	Razkužimo roke.	Preprečujemo okužbe.
18.	Poseg dokumentiramo v dokumentacijo zdravstvene nege	Zagotovimo kontinuiteto in pretok informacij med člani tima

Opombe, omejitve protokola:

- Študentje, dijaki in pripravniki lahko postopek izvajajo pod nadzorom mentorja
- Zaščitne rokavice uporabljamamo samo kadar je potrebna toaleta očesa in kadar obstaja nevarnost za prenos okužbe.
- Kadar dajemo mazila dojenčkom, malim otrokom ali vedenjsko prizadetim pacientom sta za izvajanje postopka potrebni vsaj dve osebi.

Temeljna literatura:

- Ophthalmic Procedures in the Office and Clinic, 3rd Edition. San Francisco. American Society of Ophthalmic Registered Nurses; 2011: 62-8.
- Stein AH, Stein RM, Freeman MI. The Ophthalmic Assistant. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2006: 135-6.
- Pudner R. Nursing The Surgical Patient, 3rd ed. Elsevier Limited; 2010: 171-3.
- Shaw EM, Lee A, Stollery R. Ophthalmic Nursing, 4th ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010: 32-40.
- Marsden J. An Evidence Base for Ophthalmic Nursing Practice. West Sussex: Wiley; 2007: 161-3.
- Nendl T. Dajanje očesne terapije. Standardi postopkov in posegov v ZN očesnega pacienta. Ljubljana: UKC Ljubljana, Očesna klinika; 2007.
- Watkinson S, Seewoodhary R. Administering eye medications. Nursing standard; 2008: 22 (18): 42-8. Dostopno na: <http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/archive/article-administering-eye-medications> (25.4.2013).

organ, ki izdaja sklep o ustreznosti:	številka sklepa:	datum:	odgovorna oseba:
sklep skrnika nacionalnega protokola	Sekcija MS in Zt v oftalmologiji	3/1/2014	Bernarda Mrzel
I. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola	Delovna skupina za nacionalne protokole ZBN	03/14	Majda Oštir
II. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola	Upravni odbor Zbornice Zveze	01/K27	Darinka Klemenc
III. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola	Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego pri MZ	05a/96-2015	Zdenka Kramar

Dokument objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze dne **02.02.2015**

Nacionalni protokol se uporablja najmanj do: **01.02.2017**

nacionalni protokol **19.02 – DAJANJE OČESNIH MAZIL**

diagnostično terapevtski posegi